



http://www.shinha.es.kr

백일해 유행에 따른 예방 안내

신하 23 -
행정실:636-6755
교무실:636-6750
담당:보건교사

학부모님 안녕하십니까? 최근 **백일해** 환자가 증가하는 추세로 이에 관한 정보 및 주의사항을 안내드리오니 백일해 예방 및 전파 차단에 유의해 주시기 바랍니다.

✓ 백일해란?

백일해는 **전염성이 매우 높은 급성 유행성 감염병**으로 처음에는 콧물, 재채기, 미열, 경미한 기침 등의 감기와 비슷한 증상이 발생했다가 **기침이 점진적으로 심해져서** 1~2주가 경과하면 빠르고 잦은 기침이 나타남. 이후 심한 기침발작 후 좁아진 성대를 통해 강하게 숨을 들이쉴 때 특징적인 높은 톤의 ‘옴(Whoop)’ 소리가 발생. 백일해는 호흡기 분비물 등의 비말 등을 통하여 호흡기로 감염되므로 기본적으로 손 위생 등 개인위생 수칙을 준수하고, 기침 증상이 있는 사람과의 접촉을 피하며, 기침 증상이 있는 사람의 경우 의료기관이나 보건소 방문시 반드시 마스크를 착용.

✓ 예방접종의 중요성

귀댁의 자녀가 백일해 예방접종을 받은 적이 없는 경우 의사와 상의하여 **연령에 알맞은 백일해 포함 백신(DTaP, DTaP-IPV, DTaP-IPV/Hib, Tdap) 접종**

< 백일해 접종대상 및 시기 >	
◇(기초접종 3회) 생후 2,4,6개월(DTaP)	◇(추가접종 3회) - 생후 15~18개월, 4~6세(DTaP) - 11~12세(Tdap)
* DTaP : 디프테리아(Diphtheriae) · 파상풍(Tetanus) · 백일해(acellular Pertussis) 항원 포함 백신, 6세 미만 접종 * Tdap : 11세 이상의 어린이 및 성인 접종	

✓ 자녀가 백일해에 걸렸거나 의심될 경우

- 백일해에 걸렸거나 의심될 경우 의료기관이나 보건소에 내원하여 진료 및 검사
※ 진단검사는 비인두 흡인액 등을 채취하여 백일해를 신속히 진단 및 치료, 추가 전파를 차단 위해 필요
- 백일해를 진단받은 경우 담임선생님께 알리고,
- 항생제 치료 중인 경우에는 **치료 5일까지**(치료를 받지 않은 경우 기침이 멈출 때까지 최소한 3주 이상 격리)는 집단 발병을 예방하기 위해 **등교를 하지 않고** 자택 격리치료 또는 입원치료
- 손 씻기를 자주하고 기침이나 재채기 할 때에는 반드시 휴지를 사용하거나 손수건이나 옷소매로 코와 입을 가리며,
- 타액이나 호흡기 분비물 등으로 오염된 물건은 비눗물로 소독하여 사용

2023. 12. 7.

신하초등학교장